

Nachblutungen nach Magenoperationen.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 24. März 1936

von

Franz Riebschläger

aus Bonn.

Gedruckt mit Genehmigung
der hohen medizinischen Fakultät der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Graff.

Korreferent: Prof. Dr. Freiherr von Redwitz.



Meinen lieben Eltern!

Problemstellung.

Nachblutungen aus dem Magen nach Operationen sind lange bekannt. Die Frage nach der Herkunft dieser Blutungen muß zunächst einmal eine Anzahl von Möglichkeiten ausschließen, die wohl einmal nach einer Operation zu einer Magenblutung führen können, ihre Begründung aber in Ursachen finden, die die Fragestellung des Themas nicht berühren. So ist es bekannt, daß es zum Krankheitsbild gehört, wenn es nach Tuberkulose, Lues, Verätzung, Stauungen, Arteriosclerose, Sepsis, Cholämie, Urämie, Diabetes, Verbrennung, Typhus, Ruhr, Appendizitis u. ä. zu Blutungen aus dem Magen kommt. Das Vorhandensein einer dieser Krankheiten bei einer Magenoperation muß bei einer Nachblutung die Quelle hierzu zunächst in eben dieser Krankheit suchen, braucht aber mit der Operation als solcher nichts zu tun zu haben.

Was uns hier interessiert ist die Tatsache, daß es zunächst einmal nach Operationen am Magen selbst, dann aber auch nach Operationen überhaupt, nachträglich zu einer Blutung kommt, deren Ursache in einer Veränderung zu erblicken ist, die durch die Operation gesetzt wurde. Es kommen hierbei die Gastroenterostomie und die Resektion in Frage. Wesentlich für die Gastroenterostomie ist es, daß das Ulcus, zu dessen Unschädlichmachung die Operation unternommen wird, im Magen zurückbleibt, und nur durch einen anderen Weg, den man dem Speisebrei gibt, von der dauernden Reizung durch diesen ausgeschlossen wird. Fast allen Autoren mit großem Operationsmaterial sind Fälle bekannt, wo dieses zurückgelassene Ulcus anfang zu bluten, kurz nach der Operation oder einige Tage später. Diese

Blutung aus dem zurückgelassenen Ulcus (I)

ist also eine Möglichkeit der Nachblutung. Wenn nun bei einer großen Resektion das Geschwür aus der Magenwand entfernt

wird, ist der Grund zu einer Nachblutung offenbar nicht mehr das Ulcus, sondern muß in einer durch die Operation sekundär gesetzten Schädigung oder in einer schlechten Ausführung der Naht gesehen werden. Diese

Insuffizienz der Naht (II)

spielte eine große Rolle; noch bevor man überhaupt eine andere Ursache kannte oder eine solche anzunehmen gezwungen war, hat man aus natürlichen Gründen jede Nachblutung mit einer schlechten Naht und dem dadurch bedingten unvollkommenen Gefäßverschluß zu erklären versucht und deshalb auf einen Ausbau einer möglichst dichten Naht den allergrößten Wert gelegt. Man mußte sich bald sagen, daß hierin eine gewisse Vollkommenheit erreicht sei, die es nicht mehr zulasse, daß die Naht als Ursache für eine Blutung verantwortlich gemacht werden könne. Wenn nun trotzdem noch Nachblutungen, oft sogar solche von erschreckendem Umfang, bei großen Resektionen eintraten, mußte man wohl oder übel danach suchen,

andere Ursachen (III)

zu finden, die für die Blutungen verantwortlich gemacht werden könnten. Hierbei hat man die verschiedensten Wege eingeschlagen und sich durchaus nicht darauf beschränkt, nur den Magen bezüglich der Schuldfrage in den Vordergrund der Betrachtung zu ziehen.

Wie schon gesagt, kommen als Magenoperationen die Gastroenterostomie und die Resektion in Frage, nach denen sich Nachblutungen ereignen können. Sie haben sich beide nacheinander entwickelt, doch obwohl die Resektion als radikalere Behandlungsart eines Geschwürs in dessen Bekämpfung einen Schritt weiter geht, hat sie es doch nicht vermocht, die Gastroenterostomie zu verdrängen. In der Zeit um 1880 wurden zum ersten Male Magenoperationen ausgeführt, abgesehen von einigen eigentlich nur zufälligen, aber kaum wissenschaftlich begründeten Vorläufern. In den Jahren vorher hatte sich Billroth sehr ernst mit der Frage befaßt, ob eine Magenoperation überhaupt möglich sei. Nachdem dann 1876 Gußebauer und von Winiwarter am Tierexperiment gezeigt hatten, daß ein Hund mit vollkommen reseziertem Magen bei geeigneter Fütterung nicht nur mit dem Leben

davonkam, sondern nach einem halben Jahr 6 Pfund zugenommen hatte, waren die letzten Bedenken geschwunden, und im Jahre 1881 versuchte Billroth seine erste Resektion. Der Patient überstand den Eingriff wie jede andere Operation, und dies war für Billroth der Beweis der Durchführbarkeit seiner neuen Ulcus-Behandlung. Im selben Jahre führte er noch im Ganzen vier Magenoperationen durch, von denen drei letal verliefen, was aber mehr durch den schlechten Allgemeinzustand, weniger durch die Operation selbst bedingt wurde. Daß in den Krankenberichten Billroths nichts von Nachblutungen verzeichnet ist, darf bei der geringen Anzahl seiner Fälle weiter nicht verwundern, es berechtigt aber nicht zu der Annahme einer in dieser Beziehung besonders guten Ausführung der Operation.

Seit der Begründung dieser neuen chirurgischen Therapie des Magengeschwürs durch Billroth währte es naturgemäß seine Zeit, bis die übrigen Chirurgen es wagten, den gleichen Eingriff vorzunehmen. Nachdem aber die anfängliche Scheu überwunden war, war es ganz dem Belieben des Operateurs anheimgestellt, wo die Herrschaft des Messers einsetzen sollte. Erst später auf dem Berliner Chirurgen-Kongreß von 1894 wurde manchem chirurgischen Unwesen durch allgemeine Richtlinien ein Ende gesetzt, nach denen eine Operation gerechtfertigt erschien. Dies waren:

1. Perforationsperitonitis.
2. Stenosen des Pylorus durch ein vernarbendes Geschwür oder Ca.
3. Häufige und unstillbare Blutungen.

Die anfangs versuchten Methoden waren sehr vielfältig, doch kam man mit ihnen nicht sehr weit; man glaubte, ausschließlich dem Geschwür erfolgreich zu Leibe gehen zu können, wenn man es entfernte; daß man bei solchen Plastiken dann sehr oft den Magenausgang einengte, war schließlich Grund dazu, auf indirektem Wege das Geschwür zur Heilung zu bringen, oder wenigstens die oft lebensbedrohlichen Blutungen einzuschränken. Es wurde eine Reizverminderung des Geschwürs angestrebt, und so dem Speisebrei ein anderer Ausgang aus dem Magen geschaffen durch Anlegen der Gastroenterostomie. Hiermit hatte man große Erfolge,

und die von Wölfler zuerst angegebene Methode erfuhr zahlreiche Umbildungen. Gründe, die zu solchen Veränderungen Veranlassung gaben, waren:

1. Die Kompression des Colon transversum.
2. Ungenügender Abfluß in das abführende und Zurückfließen in das zuführende Dünndarmstück.
3. Fistelbildung bei einer zu weit coecalwärts gezogenen Dünndarmschlinge mit konsekutiver Inanition und letalem Ausgang.

Diese üblen Zufälle, namentlich die der Fistelbildung, versuchten nun die verschiedensten Chirurgen durch Veränderung der Methode zu umgehen. Gegenüber der gastroenterostomia antecolica Wölflers führten v. Hacker und Courvoisier die Operation als gastroenterostomia retrocolica aus. Um den Rücklauf des Speisebreis zu verhindern, beschrieb Vogt seine in den Grundzügen schon von Wölfler angegebene Methode der Gastroenterometaraphie, bei welcher er die inferierende Darmschlinge durchschnitt, das abführende Darmstück in den Magen implantierte und das zuführende Stück seitlich in den Magen einnähte. Roux führte die Operation als y-Metwode in die Technik ein. Lauenstein schlug eine Gastroenterostomie mit Enteroanastomose einer beliebigen Dünndarmschlinge vor. H. Braun setzte sich für eine solche zwischen zu- und abführendem Ende ein; Kocher bildete einen Ventilverschluß in der Magendarmöffnung, so daß der Mageninhalt nur in das abführende Darmstück fließen kann.

Da alle diese Methoden nur auf indirektem Wege die durch das Ulcus bewirkten Schmerzen und Blutungen beseitigen konnten, war die Operation nur befriedigend bei benignen Tumoren und bei Patienten mit einem klinisch nicht so sehr in Erscheinung tretenden Ulcus. Bei drohender Perforation eines Tumors oder bei ganz schweren Magenblutungen waren alle diese Wege zur Beseitigung des Übels illusorisch, da nach einer Gastroenterostomie immerhin die Möglichkeit bestand, daß der Speisebrei die Geschwürsfläche trotzdem noch berührte und eine erneute Blutung hervorgerufen bzw. Perforation bedingen konnte. Man kam so auf den Gedanken, die Gastroenterostomie anzulegen, und, um

jede neue Infultierung des Geschwürs zu vermeiden, den Pylorus als häufigsten Sitz eines Ulcus noch durch eine Quernaht von dem übrigen Magen abzuschließen. Wollte man nun noch ein Übriges tun, so konnte man die Gastroenterostomie mit einer Resektion des Pylorusabschnitts kombinieren. Dies wurde von Billroth zum ersten Male durchgeführt; er gab zwei Methoden an, die grundsätzlich noch heute im Gebrauch sind, wenn auch einige Autoren sie Veränderungen unterworfen haben.

v. Hacker, ein Oberarzt Billroths, hat die ersten 33 Operationen am Magen, die Billroth in den Jahren 1880—1885 ausführte, beschrieben; von diesen 33 Patienten kamen nur 13 mit dem Leben davon, 20 starben. Wenn auch sehr oft in den Krankengeschichten von Anämie gesprochen wird, so wird doch nirgendwo erwähnt, daß typische Nachblutungen beobachtet worden sind. Man muß sich darüber wundern, da man postoperative Blutungen gerade in der Anfangszeit, bei noch nicht so gut entwickelter Technik, hätte erwarten können. Man muß bezüglich der Frage nach Nachblutungen bis in die neuere Zeit gehen, wo ein riesiges Operationsmaterial und sehr viele Erfahrungen dazu veranlaßt haben, der Entstehung einer vielleicht früher mit anderen Augen angesehenen Nachblutung auf die Spur zu kommen.

Blutungen aus dem zurückgelassenen Geschwür.

Die Tatsache, daß auch heute noch die Gastroenterostomie ausgeführt wird, liegt darin begründet, daß die Resektion eine bedeutend höhere Sterblichkeitsziffer aufzuweisen hat, als die Gastroenterostomie. Nach einer großen Statistik von v. Redwitz kamen auf

97 Gastroenterostomien

6 Todesfälle.

Hingegen auf

134 Resektionen

16 Todesfälle.

Nach Brütt bewegt sich die Operationsmortalität der Resektion zwischen 8 und 15%, bei der Gastroenterostomie ergaben die Statistiken der letzten Jahre die durchschnittliche Sterblichkeit von 2 bis 5%. Gründe, die dennoch eine Resektion vorteilhaft erscheinen lassen, sind:

1. Die Möglichkeit der Umwandlung des Ulcus in ein Ca.
2. Nach Gastroenterostomie sehr häufig Auftreten eines Ulcus jejun.
3. Blutung aus dem zurückgelassenen Ulcus nach Gastroenterostomie.

Zu diesem letzten Punkt sind nicht sehr viele Fälle in der Literatur bekannt geworden. Krecke hat ganz besonders schlechte Erfahrungen gemacht: nach 152 ausgeführten Gastroenterostomien der letzten 20 Jahre gab es bei ihm in 11 Fällen, das sind nahezu 8%, eine Nachblutung; 5 der in Betracht kommenden 11 Patienten starben an den Folgen dieser Blutung. Die übrigen Zahlen in der Literatur sind viel kleiner: Kreuter hat unter 473 Gastroenterostomien nur zweimal eine Nachblutung erlebt, Exalto bei 208 Gastroenterostomien viermal. v. Redwitz sah bei 97 Gastroenterostomien keine Nachblutung, Küttner bei einer allerdings nicht bekannten Zahl drei.

Der Eintritt der Blutung geschah gewöhnlich am selben Tage bzw. einen Tag nach der Operation. Daß die Blutung auch aus dem Ulcus eintrat, dafür glauben alle Autoren auf Grund ihrer sehr sorgfältigen Nachbehandlung und der — allerdings nicht in allen Fällen getätigten — Sektion eintreten zu können. Bei einigen Patienten wurde dann nachträglich eine Resektion vorgenommen mit dem Ergebnis, daß die Blutung sofort stand.

Krecke glaubt, daß die Gastroenterostomie in gewisser Weise an den Nachblutungen die Schuld habe und vermutet, daß das Manipulieren am Magen und das Betaften der Geschwüre leicht eine Lockerung eines Thrombus und somit eine kurz nach der Operation deutlich werdende, wenn auch nicht zu große, aber intensive Blutung hervorrufe. Speziell Krecke hat sich auf Grund seiner zahlreichen Blutungsfälle nach Gastroenterostomien dazu veranlaßt gesehen, in günstigen Fällen die Resektion zu bevorzugen. Und so seine Statistik:

bis zum Jahre 1918: 118 Gastroenterostomien,
18 Resektionen;

in den Jahren 1919/20: 34 Gastroenterostomien,
35 Resektionen.

Bei der Behandlung einer einmal eingetretenen Nachblutung nach einer Gastroenterostomie glaubt K r e c k e eine abwartende Stellung nicht verteidigen zu können, da er auf diese Art kurz hintereinander drei Patienten verloren hat. Seit dieser Zeit hat er entweder sofort, am selben Tage, oder, wenn es der Zustand des Patienten gar nicht erlaubte, erst am Tage danach eine nochmalige Operation mit einer Refektion vorgenommen. Von den so behandelten Fällen hat er zwei retten können, ein Patient mit einer sehr schweren Verwachsung ist gestorben. Somit ist Voraussetzung für diese Art der Behandlung: die Verwachsungen des Geschwürs dürfen nicht allzu groß sein, so daß die zweite Operation keinen allzu schweren Eingriff darstellt.

Im übrigen hat eine solche Geschwürsblutung nach einer Gastroenterostomie durchaus nicht zur Voraussetzung, daß das Geschwür ein besonders großes ist. Gegenteilig hat K r e c k e einen Patienten operiert, bei dem sich nur eine einzige, stecknadelkopfgroße Erosion im Magen befand. Hier eine Gastroenterostomie anzulegen schien ihm das Gegebene, und doch wurde er in der Folge eines Besseren belehrt, indem kurz nach der Operation eine erneute stärkere Blutung einsetzte, die er auf die oben angeführten Gründe der starken Erschütterung des Magens zurückführte. Die sofort angelegte Operation mit Refektion ergab dann auch völliges Aufhören der Blutung und Ausheilung.

In diesem Zusammenhang erinnerte er sich eines ähnlichen Falles zwanzig Jahre früher, als er diesbezügliche Erfahrungen noch nicht gemacht hatte und so eine unbekannte Todesursache annehmen mußte: ein 48jähriger Mann litt seit acht Jahren an Magenbeschwerden und seit vier Wochen an Bluterbrechen. Bei der Laparotomie konnte am Magen etwas Krankhaftes nicht gefunden werden, ein operativer Eingriff wurde deshalb unterlassen. Am nächsten Tage kam es zu einer schweren Magenblutung, die am übernächsten Tage zum Tode führte. Die genaue postmortale Untersuchung des Magens ergab nur einige oberflächliche Erosionen, aber kein eigentliches Ulcus.

In der Aussprache zu diesen Veröffentlichungen K r e c k e s teilt S a u e r b r u c h mit, daß er bei zwei Patienten, denen ein

Ulcus refeziert wurde, eine Nachblutung erlebte; einer von ihnen starb 14 Tage später an den Folgen dieser Blutung, der andere erholte sich wieder. Er hat den Ursachen dieser Blutung nicht nachgeforscht, jedoch da das Ulcus refeziert wurde, ist anzunehmen, daß es sich um eine Blutung aus der Naht gehandelt hat. Bei diesen

Blutungen aus der Naht

soll zunächst einmal kurz etwas über die Technik gesagt werden, wie sie v. H a b e r e r nach über 2700 Fällen als die sicherste erkannt hat.

Nach Fertigstellung der Naht der Seromuscularis, vor Aneinanderlegung von Magen- und Doudenalende durchtrennt v. H a b e r e r nun die Seromuscularis der Magen hinterwand bis auf die Submucosa mit dem Scalpell. Dabei werden die hier sehr zahlreichen Blutgefäße sichtbar, die nun mit feinen Katgut-Kopfnähten partienweise und zwar mittels Hinterstich, um kein Gefäß zu übersehen, umstochen werden. Es ist belanglos, wenn dabei die Nadel durch die Schleimhaut hindurch ins Magenlumen gerät. Diese Umstechungen bezwecken einerseits in erster Linie die möglichste Verhinderung einer Nachblutung aus der Anastomose, andererseits raffen sie in gewünschter Weise die Magenwand und engen das Lumen ein. Auf der Vorderseite geht man genau so vor. Nach Abtragung des betreffenden Magenteils beginnt dann die Aneinanderlegung von Magen und Darm, wobei dann zur Sicherheit der Blutstillung die Umwendlungsnaht angewandt wird. Diese Naht ist eine fortlaufende, die alle Schichten, Seromuscularis und Schleimhaut ergreift.

Bezüglich der Schleimhaut selbst hat J o h n s o n eine Methode angegeben, die nach seinem Begriff bei guter Ausführung eine Nachblutung unbedingt zu verhindern imstande ist. Zwei Operateure nähen, indem sie die Fäden überkreuzen und danach die Nadeln tauschen. Bei festem Anziehen wird die Naht absolut undurchlässig, was am leichenoperierten Magen nachgewiesen wurde, den man mit Wasser füllte.

Ob eine Naht der Schleimhaut angelegt werden soll oder nicht, darüber bestehen verschiedene Ansichten. Wird ein querer Wangen-

schnitt gemacht, so vernäht man ihn, ohne die Schleimhaut mitzufassen. Ebenso bei Lippenplastiken. Wird die Speiseröhre eröffnet, geht man in gleicher Weite vor; bei der Blasennaht faßt man auch nur die Muskelschicht und sieht ausgezeichnete strichförmige Narben entstehen, die man oft Mühe nach, nachzuweisen. Daß es hier auch ohne genaue Nahtanlagerung zu einer glatten Aneinanderlegung der Schleimhautränder kommt, muß man den Kräften im Körper zuschreiben, die man „Baupläne“ genannt hat, und die nach einer Verletzung eine *restitutio ad integrum* herbeizuführen bestrebt sind.

Dies Verfahren ist bisher nur selten am Magen-Darm-Kanal angewandt worden. Die große Mehrzahl der Chirurgen steht auf dem Standpunkt, daß hier die Notwendigkeit der Anlegung einer Schleimhautnaht gegeben ist, deswegen, weil man befürchtet, daß es infolge der sehr starken Blutverlorgung des Magens ohne eine Naht der Schleimhaut leicht zu einer Nachblutung der nicht gut gedeckten Wunde kommen könne. Gegen die Schleimhautnaht bei Magen-Darm-Operationen spricht sich K u l e n k a m p f f aus, der in einer Reihe von Fällen keine Naht der Schleimhaut anlegte und seine Resultate mit den übrigen vergleicht. Hierbei ergibt sich, daß eine Naht der Schleimhaut am 6., 8. oder 10. Tage nach der Operation noch sehr gut als Naht zu erkennen ist. Man sieht Stellen glatter Verheilung neben solchen, in denen ein gewisses Klaffen der Ränder vorhanden ist, die schmierig belegt sind. Der Eindruck entspricht durchaus nicht dem, was man nach einer sorgfältig ausgeführten Schleimhautnaht erwarten sollte. Hierüber äußert sich P o d r a s, der meint, daß Struktur und anatomische Verhältnisse der Schleimhaut so einfach sind, daß man denken sollte, die *prima intentio* wäre hier leichter zu erreichen, als etwa an der Haut. Wenn nun dem nicht so ist, wie die Praxis zeigt, dann muß der Grund hierzu in den Produkten liegen, die teils als Absonderung der Drüsen der Schleimhaut, teils aus anderen Organen an die Naht herantreten, zu einer Infektion führen und einer primären Vereinigung hinderlich sind.

Diesen genähten Schleimhautwunden stellt K u l e n k a m p f f die andere Art der Vereinigung gegenüber, wobei er die Wund-

ränder ohne Naht, mit der Messerquetsche aneinanderlegt. Im selben Zeitraum nach der Operation kann man nur noch mit Mühe etwas von der Schleimhautwunde erkennen, sie ist praktisch geheilt und vollkommen glatt. Aus diesem Grunde ist Kulenkampff völlig von der Schleimhautnaht am Magen-Darm-Kanal abgegangen. Speziell am Magen geht er nun so vor, daß er wegen der starken Blutgefäße eine besondere exakte Blutstillung erstrebt, was aber auch dann erforderlich sein dürfte, wenn eine gefonderte Schleimhautnaht angelegt wird. Auch technischen Gründen ist es notwendig, den nicht zur Anastomose verwendeten Teil in üblicher Form mit doppelter Naht zu verschließen. Ob es nun ohne die Schleimhautnaht gelingen wird, das Ulcus pepticum zu vermeiden, muß die Zukunft zeigen. In günstig gelegenen Fällen verschließt er den Magen ganz und anastomosiert mit der Messerquetsche, wobei ja auch die Schleimhautnaht fortfällt. Obgleich hier eine erhebliche Quetschung erfolgt, so waren es doch gerade die Erfahrungen mit der Messerquetsche, die ihn dazu veranlaßten, die Schleimhautnaht auch am Magen-Darm-Kanal aufzugeben. Kulenkampff erwähnt nichts von Nachblutungen; gerade dies interessiert bei seiner Methode besonders, da man doch nur um diese zu verhindern, bei Magen-Darm-Operationen die Schleimhaut genäht hat. Daß er auf gute Unterbindung der Gefäße großen Wert gelegt hat, wurde bereits gesagt, und vielleicht ist nur dies der Grund, warum er keine üblen Erfahrungen gemacht hat. Wenn aber dies der Fall ist, so ist die Nachblutung überhaupt nur in einer schlechten Gefäßunterbindung zu suchen, die Naht der Schleimhaut selbst jedoch nur von untergeordneter Bedeutung. Aber noch etwas muß bei der Begutachtung der kritischen Frage berücksichtigt werden, das ist die Tatsache, daß nach Anlegung einer Schleimhautnaht diese erst spät — nach 6—8 Tagen — durch Sekretionen verunreinigt wird, also in den ersten Tagen nach der Operation noch als gut schließend zu betrachten ist. Wird hingegen die Schleimhaut nur mit Hilfe der Messerquetsche mehr oder weniger lose aneinandergelegt, so muß eine kurze Zeit nach der Operation aus einem übersehenen, nicht verschlossenen Gefäß eintretende Blutung ungleich leichter den Weg durch die nicht mit Naht verschlossene

Schleimhaut ins Magenlumen finden können, als wenn die Wunde durch eine Naht verschlossen war und wegen der kurzen Zeit durch Sekretion noch kein Klaffen der Wunde vorhanden war. Wenn nach 6—8 Tagen es zum vorher beschriebenen Klaffen der Wundränder an einzelnen Stellen kommt, wird eine Nachblutung aus einem übersehenen Gefäß bereits zum Versiegen gekommen sein. Tatsache ist ja auch, daß die bedrohlichen Nachblutungen stets innerhalb der ersten drei Tage sich zu ereignen pflegen. Wir müssen daran festhalten, daß eine nur mit der Messerquetsche aneinandergelegte Schleimhaut bei einer eintretenden Blutung dieser viel weniger Widerstand entgegenzusetzen vermag, als die in den ersten Tagen noch sehr feste Naht; der besonderen Naht der Schleimhaut am Magen-Darm-Kanal ist deswegen der Vorzug zu geben.

Die Schleimhautnaht so fest anzulegen und dabei die Gefäße so gut zu unterbinden, daß eine Nachblutung möglichst verhindert wird, ist nun der Sinn einer jeden Technik. Man müßte annehmen, daß bei äußerst sorgfamer Arbeit dies zu erreichen sein müßte, und doch belehren uns die Erfahrungen vieler Autoren, daß eine Nachblutung aus der Naht eintreten kann, selbst wenn man nicht annehmen kann, daß ein Gefäß übersehen wurde. Es ist daher notwendig, auch nach anderen Gründen zu suchen, die ein Bluten aus einer Nahtstelle erklären können.

Krabbel sah unter rund 300 Operationen am Magen 7mal eine ernste Nachblutung. In allen 7 Fällen handelte es sich um junge Männer mit kleinem Ulcus duodeni. Jedesmal wurde die Mayo'sche Raffung gemacht, die das Ulcus einstülpt und fest an die gegenüberliegende Wand des Darmes anpreßt. Damit erscheint die Annahme einer Blutung aus dem zurückgelassenen Ulcus schon recht unwahrscheinlich; zudem bestand in einem Falle eine gedeckte Perforation mit kleinem, scharfrandigem Defekt, und Ulcera in diesem Stadium bluten erfahrungsgemäß sehr selten. Im ersten Fall, der eintrat, hat er am Abend des Operationstages, als der Zustand des Kranken sehr ernst wurde, relaparatomiert und an der vorderen Magenwand die Gastrotomie gemacht. Der Magen war leer, auf der Stelle der Gastroenterostomie ein paar kleine Gerinnsel.

Kein blutendes Gefäß war zu sehen. Er hat nichts anderes unternehmen können, als Magen und Bauch zu schließen, worauf sich die Blutung aber nicht mehr wiederholte und der Kranke gefunden wurde. Nach dieser Erfahrung hat er sich in späteren Fällen auf konservative Maßnahmen beschränkt: intravenöse NaCl-Injektion in hypertonischer Lösung, Trinkenlassen von Clauden-Aufschwemmung. Er hat nie einen ungünstigen Ausgang gesehen.

Seine Technik: Es wurde prinzipiell die hintere vertikale Gastroenterostomie am tiefsten Punkt des Magens, also an der großen Kurvatur gemacht. Naht fortlaufend in dreifacher Schicht, mit feiner Seide. Die sichtbaren Gefäße der Subserosa und Muskularis des Magens wurden vor der Durchtrennung doppelt gefaßt und unterbunden. Die von der großen Kurvatur einspringenden größeren Gefäße wurden außerhalb der Gastroenterostomie in der Kontinuität umstochen; die Anastomose wurde unter Anwendung von Doyen'schen Klemmen angelegt.

K r a b b e l hebt ausdrücklich seine stets gleichbleibende Technik und die exakte Blutstillung hervor. Trotzdem treten immer wieder ganz überraschend abundante, geradezu erschreckende Blutungen ein. Dies veranlaßt K r a b b e l, die Frage aufzuwerfen, ob nicht endogene, biologische Schädlichkeiten im Spiele sind, und nicht etwa die gefürchteten, der Verantwortlichkeit des Operateurs unterliegenden exogenen Schädlichkeiten: technische Fehler, mangelhafte Blutstillung, Klemmendruck.

Ein Fall ganz besonders scheint ihm den Beweis zu bringen, daß solche Gedankengänge berechtigt sind: er operierte einen 20jährigen Mann wegen eines kleinen Ulcus duodeni. Er machte wie immer Mayo'sche Raffung und gastroenterostomia post. retr. vert. Nachmittags ereignete sich eine schwere Nachblutung, die schließlich mit konservativen Maßnahmen zu beherrschen war. Nach 1½ Jahr kam der Kranke mit den gleichen Beschwerden wieder ins Krankenhaus. Nach dem Röntgenbild handelte es sich um eine Stenosierung der Gastroenterostomie-Öffnung. Die Operation bestätigte diesen Befund: das Ulcus war abgeheilt, der Pylorus narbig verengt, die Gastroenterostomie auf Bleistiftdicke stenotisiert. Die Anastomose wurde auf die gehörige Breite erweitert. Um

der Blutungsgefahr besonders bei diesen Patienten aus dem Wege zu gehen, wurde in allerpeinlichster Weise jedes, auch das kleinste Gefäß unterbunden. Trotzdem ereignete sich eine schwerste Nachblutung, die den Kranken äußerst gefährdete und nur mit Mühe zum Stillstand gebracht werden konnte. Dieser Patient hat sich einer späteren Nachuntersuchung leider entzogen.

Einen weiteren Patienten mit einer schweren Nachblutung hat er dann — bereits bewußt seiner Annahme nachgehend — vier Wochen nach der Operation von interner Seite nachuntersuchen lassen, mit folgendem Ergebnis:

Milz perkutorisch und palpatorisch vergrößert; das Blutbild zeigt auffallende Leukopenie und Trobopenie.

Dies ist eine deutliche biologische Normabweichung. Aus diesen beiden Fällen bündige Schlüsse zu ziehen, ist nicht angängig; die Möglichkeit, daß endogene Schädigungen eine Rolle spielen, scheint jedoch gegeben. Durch kapillar-mikroskopische Untersuchungen von Otfried Müller ist es bestätigt worden, daß eine Labilität des Gefäßsystems in das Bild der Ulcus-Diathese gehört. So glaubt K r a b b e l auch annehmen zu dürfen, daß es kein Zufall ist, wenn in seinem Material die Nachblutung nur bei der Operation eines Ulcus, nie beim Ca eintrat. Und da neuerlich das Ulcus als letzte Auswirkung einer Ulcus-Diathese, Ulcuskrankheit, angesehen wird und konstitutionelle Faktoren mehr Bedeutung gewinnen als früher, so meint K r a b b e l, daß es kein großer Schritt weiter wäre, wenn man eine erhöhte Blutungsbereitschaft als zur Ulcuskrankheit gehörig betrachte. Sie wäre dann verschieden ausgebildet, bei dem einen blutet es eher als bei dem anderen. Wenn aber jemand eine solche Blutungsbereitschaft als eine biologische Abnormität im Zusammenhang mit einem Ulcus besitzt, dann nützt das peinlichste Verfahren beim Abbinden der Gefäße nichts, es blutet trotzdem.

Dies ist die immerhin begründete Meinung K r a b b e l's, die er seinen Fachkollegen unterbreitet. Über deren Stellungnahme soll kurz berichtet werden.

Zunächst kann K r e c k e in der Sitzung der Münchener Chirurgen-Vereinigung vom 24. Januar 1928 über Blutungen nach Magenoperationen berichten. Vor sieben Jahren hatte er elf solcher

Fälle vorstellen können; seitdem hat sich die Zahl um acht erhöht. Früher hatte er als Quelle der Blutung stets das zurückgelassene Ulcus anführen müssen. Nach diesen neuen Fällen und den Veröffentlichungen K r a b b e l s und anderer Autoren (siehe unten) muß man annehmen, daß es auch aus der Operationswunde bluten kann. In der auf diesen Bericht folgenden Diskussion stellt sich K r e c k e auf den Standpunkt, daß es sich bei solchen Blutungen aus der Operationswunde um eine besondere Blutungsbereitschaft handeln müsse. Als Stütze für seine Behauptung dient auch ihm die Tatsache, daß er eine gute Technik angewandt habe und auf sorgfame Unterbindung aller Gefäße größten Wert gelegt und daß mit einer Ausnahme die Blutungen sich nur bei Ulcus-Kranken ereignet haben. v. R e d w i t z hingegen steht nicht auf diesem Standpunkt, er hat in seiner Klinik keine Nachblutungen erlebt und betont, daß es wichtig sei, zu unterscheiden zwischen den eigentlichen, unmittelbaren postoperativen Nachblutungen und solchen, die sich bei zurückgelassenem Ulcus einige Zeit später ereignen. Und so nennt er auch als bestes Mittel, die postoperative Nachblutung zu vermeiden, eine gute Technik. Am meisten zu empfehlen ist in dieser Hinsicht eine gute Naht; auch er steht auf dem Standpunkt, daß eine Schleimhautnaht unbedingt angelegt werden muß, und daß bezüglich einer Nachblutung auf diese Naht der Schleimhaut besonders Wert zu legen ist. Eventuell sollen die Klemmen einige Zeit vorübergehend gelüftet werden, um einzelne Gefäße beim Abbinden nicht zu übersehen. Zu einer eventuell nötig werdenden Relaparatomie soll man sich nicht zu spät entschließen, zumal da es begreiflich ist, daß sich der bedrohliche Charakter oft nur schwer erkennen lasse.

W o l f f o h n kann sich den Gedankengängen K r a b b e l s, an eine endogene Schädlichkeit zu glauben, nicht verschließen. Er führt einen Fall an, bei dem ihm die eintretende Nachblutung völlig unerklärlich blieb, den einzigsten Fall unter 150 Operationen.

„Es handelte sich um einen 21jährigen jungen Mann mit Ulcus duodeni, bei dem die Operation so glatt und so einwandfrei wie nur möglich verlief. Es wurde eine gastroenterostomia retrocolica post. vert. angelegt. Am Abend des Operationstages trat unter

mäßiger Temperaturerhöhung Unbehagen und Aufstoßen auf. Nachts mehrfaches Erbrechen, das sich allmählich immer blutiger färbte. Am anderen Morgen abundantes Blutbrechen. Große Unruhe, Puls klein, 130—140. Ich hielt es für unzweifelhaft, daß hier eine bedrohliche Nachblutung aus einem größeren Gefäß vorlag und schritt zur Relaparatomie. Bei Eröffnung der Gastroenterostomiestelle fand ich diese im großen und ganzen in Ordnung. An einigen Stellen war die Naht mit kleinen Blutkoagula bedeckt, aber nirgends war ein irgendwie stärker blutendes Gefäß zu erkennen. Ich streute auf die Nahtlinie Clauden und schloß dann die Wunde wieder. Kochsalzinfusion. Herzanaleptica. Der Kranke hat auf diesen Eingriff mit sehr hoher Temperatur reagiert, sich aber im übrigen erholt.“

Der Augenschein widerlegt bei der Relaparatomie die Annahme, daß ein größeres Gefäß geblutet habe; Blutung aus dem Ulcus mußte ausgeschlossen werden, da das Ulcus vor der Operation niemals nennenswert geblutet hatte und auch bei der Operation kaum berührt worden war. Somit glaubt W o l f f o h n, wenn ihm der Fall nicht völlig unerklärlich bleiben sollte, die zwar noch nicht in ihren Ursachen begründete Annahme einer endogenen Schädlichkeit machen zu müssen.

J u n g b l u t h kann nach seinen Erfahrungen dieser Auffassung nicht zustimmen. Auch er hatte immer die vertikale Gastroenterostomie am tiefsten Punkt des Magens ausgeführt, die Naht nach Garrè fortlaufend dreifach mit feinsten Seide gelegt und die sichtbaren Gefäße noch einzeln gefaßt. Die Klemmen blieben geschlossen. Er erlebte bei 100 Gastroenterostomien 4 schwere Nachblutungen, die alle konservativ behandelt wurden und auch zum Schluß günstig verliefen. Sie traten 8—30 Stunden nach der Operation ein. Manipulationen in Geschwürsnähe wurden stets peinlichst vermieden. J u n g b l u t h führt diese Zwischenfälle auf Blutungen aus der Magenschnittwunde zurück, die eben in diesen Fällen nicht gut genug versorgt war, sodaß noch irgendwo ein Gefäß unverschlossen geblieben war. Nachdem die untere Serosa- und Muscularisnaht gelegt war, der Magen bzw. der Darm eröffnet war, die größeren Gefäße mit Péans gefaßt waren, hat er

nun, um das Offenbleiben eines Gefäßes zu verhindern, die vorher gelegten Klemmen vorsichtig geöffnet und dann noch jedes blutende Gefäß eigens mit spitzem Péan gefaßt und mit feinsten Seide abgebunden. Bei der Öffnung der Klemmen wurden dann immer noch spritzende Gefäße festgestellt, es war aber auch die Schleimhautnaht noch nicht gelegt. Dies geschah dann noch; Jungbluth hält es für möglich, daß selbst danach es noch nicht mit Sicherheit zu sagen sein könnte, daß es nicht nachher aus einem Gefäß zu einer Blutung kommen könnte. Entweder waren dann die Maschen der fortlaufenden Nähte irgendwo zu weit, von Anfang an nicht fest genug angezogen, oder sie lockerten sich später. Dies wäre dann die Ursache der Nachblutung, die zum Stehen kommt, wenn infolge Sinkens des Blutdrucks das fragliche Gefäß thrombosiert. Bezüglich dieser Blutungsmöglichkeit aus einem kleinen Schleimhautgefäß meint Finsterer, daß nur dies die Ursache einer Blutung nach einer Operation sein könne, da er es für ausgeschlossen hält, daß ein großes arterielles Gefäß beim Abbinden übersehen werden könnte. Jedenfalls hat die besondere Umstechung der Schleimhautgefäße bei deren Naht Jungbluth den Erfolg gebracht, der ihm seine Anschauung bestätigte: bei den nachfolgenden über 200 Gastroenterostomien wurde der schwere Zwischenfall der Nachblutung nicht mehr beobachtet.

Diese Deutung Jungbluths widerspricht der Annahme Krabbels, der sich aber durch ihn nicht widerlegt sieht. Wenn Jungbluth behauptet, daß es auf eine exakteste Abschnürung der kleinsten Gefäße ankomme, so kann Krabbel beweisen, daß dies zwar mit einer anderen Technik doch stets sein Ziel gewesen sei; trotzdem hat aber bei ihm die Komplikation der Nachblutung nicht verhindert werden können, wenigstens in einigen Fällen nicht. Er weist vor allem auf seinen Fall einer schwersten Nachblutung bei zweimal ausgeführter Gastroenterostomie hin, der ihm in seiner Richtung besonders beweisend erscheint. Auch kann er sagen, daß ihm von keiner Seite her die Behauptung bestritten worden sei, daß bei einer Gastroenterostomie wegen Ca solche Blutungen nicht beobachtet worden seien. Er hält also an seiner Meinung einer besonderen konstitutionellen Blutungsbereitschaft fest,

die vielleicht im Sinne einer herabgesetzten Gerinnungsfähigkeit des Blutes bei Ulcus-Kranken zu suchen sei, und bittet, durch genaue Prüfung des Blutstatus in solchen Fällen weiteres Material zu dieser noch recht bedeutungsvollen Frage zu sammeln.

Von früheren Arbeiten seien zunächst die Untersuchungen H u e c k's genannt, der über die Gerinnungsfähigkeit des Blutes hauptsächlich der Anzahl und Form der Thrombocyten seine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Zunächst erwähnt er, daß es keine exakte Zählmethode der Blutplättchen gibt, was einmal durch die starke Agglutinationstendenz derselben, ein andermal durch das Haftenbleiben der klebrigen Gebilde am Instrumentarium bedingt ist. Dies drückt sich auch im Resultat der verschiedenen Zählmethoden aus: es werden als normal Werte von 130 000—750 000 angegeben. H u e c k benutzte die Methode von Fonio, die ihm die beste zu sein schien, und untersuchte damit 100 Fälle von chirurgischen Erkrankungen verschiedenster Art. Werte die hier interessieren sind: bei 26 Ca-Fällen (darunter 9 Ca ventriculi) wurden 18 mal die Werte normal gefunden, 5 mal lagen die Zahlen unter der Norm, 3 mal oberhalb der normalen Grenzen. Von 10 Fällen Ulcus ventriculi lagen 8 an der untersten Grenze, 2 davon noch unterhalb, bis 85 000. Hierzu meint H u e c k, daß dieser immerhin vorhandenen Minderung der Blutplättchen-Werte deshalb keine differenzialdiagnostische Bedeutung gegenüber dem Ca zukommen könne, weil sie zumeist noch innerhalb der Norm lägen und außerdem nicht regelmäßig genug vorkämen. Bei der Beobachtung der Plättchen-Form fiel als einzigstes auf, daß in postoperativen Tagen sowohl in den Zeiten der Erniedrigung wie der Erhöhung der Zahlen größere Formen häufiger als vor dem Eingriff zu Gesicht kamen. H u e c k kommt also nach diesen Untersuchungen zu dem Schluß, daß nach Operationen die Blutplättchen eine gewisse Alteration erfahren, daß aber keineswegs dies dazu berechtige, hierin eine mangelhafte Gerinnungsfähigkeit des Blutes zu sehen, da die hierzu nötige Regelmäßigkeit durchaus nicht erwiesen sei.

Er steht hierbei in einem gewissen Gegensatz zu S s o k o l o f f und G l a d y r e w s k y, die 1924 an der Moskauer Universitätsklinik 1080 Untersuchungen an 80 Kranken über die postoperative

Veränderung der Zahl der Erythrocyten und Thrombocyten machten. Sie kamen hierbei zu folgenden Schlussergebnissen:

1. Die Zahl der Blutplättchen sinkt nach Operationen in allgemeiner Narkose schon in den ersten Stunden, besonders stark am zweiten und dritten Tag, wo sie sogar pathologische Ziffern erreicht, und beginnt am sechsten Tag wieder anzusteigen; am zehnten Tage kehrt die Zahl der Blutplättchen wieder zur Norm zurück.
2. Die Thrombocytenzahl und die Gerinnungszeit des Blutes stehen in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis.
3. Die Zahl der Erythrocyten zeigt nach der Operation keine besonderen Veränderungen.

Auf diese Feststellungen wird später noch eingegangen werden.

Die Bitte von K r a b b e l hat dann N ä g e l i - Bonn aufgenommen und im angegebenen Sinne Untersuchungen an der Bonner Chirurgischen Klinik angestellt. Auf seine Anregung hin hat H. N e u f e r Blutuntersuchungen vor und nach operativen Eingriffen am Magen angestellt. Es wurde hierbei beobachtet:

1. Zahl der Erythrocyten.
2. Absolute und relative Zahl der Thrombocyten.
3. Gerinnungszeit.
4. Resistenz der Erythrocyten.

Die erste postoperative Untersuchung erfolgte am vierten oder fünften Tag, also zu einem Zeitpunkt, wo die primären Operationseinflüsse auf den Organismus mit Wahrscheinlichkeit als eliminiert angesehen werden konnten. Auch hier wurden die Thrombocyten nach Fonio bestimmt. Es sei die Art der Untersuchung an einem Beispiel erläutert:

O. K., 44 Jahre, Landwirt.

Art der Operation: Resektion nach Billroth II oralis totalis mit B r a u n 'scher Anastomose.

Diagnose: Zwei etwa erbsengroße, einander gegenüberliegende ulcera ventriculi, Myom am Pylorus, mäßige Erweiterung des Magens.

Verlauf: Glatt, ohne Komplikationen.

Die Blutbilder wurden wie folgt aufgestellt:

Datum	Erythrocyten	absolute Thrombocyten Werte	relative Thrombocyten Werte	Ge- rinnungs- zeit
2 Tg. a. o.	4920000	270600	55	5½
4 Tg. p. o.	4100000	250100	61	6
9 Tg. p. o.	4130000	342790	83	5
12 Tg. p. o.	4460000	441540	99	5
15 Tg. p. o.	4795000	402780	84	4½

Diese Untersuchungen wurden an 42 Patienten gemacht, vornehmlich an solchen, die eine Magenoperation durchgemacht hatten. Die Ergebnisse, die hier in Frage kommen, sind folgende:

I. Erythrocyten.

Bei allen 42 Untersuchungen läßt sich nach der Operation eine Verminderung der Zahl der roten Blutkörperchen feststellen. Die Verminderung beträgt bei der erstmaligen Untersuchung (am vierten Tage p.o.)

bei Magenrezektionen (20 Fälle) im Mittel 922000,

bei Gastroenterostomien (6 Fälle) im Mittel 634000.

W. K ö n i g hat durch experimentelle Arbeiten gezeigt, daß das Absinken der Erythrocyten durch drei Faktoren begründet wird:

1. Durch Blutverlust infolge der Operation.
2. Durch postoperative Kreislaufstörung.
3. Durch postoperative Zerstörung von Erythrocyten.

Es werden durch das Operationstrauma Nukleosubstanzen zerstört und resorbiert. Diese bewirken nach K ö n i g ihrerseits einen Zerfall von Erythrocyten und Thrombocyten, insofern, als sie durch eine Kreislaufstörung die Milz befähigen sollen, Erythrocyten und besonders Thrombocyten abzubauen. Die chemischen Gifte, die dies bewirken, sollen durch die Kernzerfallprodukte entstehen, und sind im Wesentlichen Xanthin und Guanosin; diese Produkte können die Milz in ihrer Funktion so beeinflussen, daß sie Erythrocyten und Blutplättchen stärker zerstört und schädigt. Dies wird dadurch bewiesen, daß nach Exstirpation der Milz die schädigende Wirkung aufhört. Ebenso kann die Wirkung von Kernabbauprodukten beseitigt werden durch Kreislaufmittel, am besten Sym-

patol. Aber noch eine andere Wirkung haben die Nukleofsubstanzen im Organismus: Sie führen durch Kreislaufstörung zu einer abnormen Blutverteilung im Körper, in dem Sinne, daß das Blut sich in die großen Gefäßbezirke, also in Splanchnicus-Gebiet und Lungen, zurückzieht. Diese postoperative Blutüberfüllung des Magen-Darm-Gebiets ist mit ein Grund, warum gerade diese Gegend des Körpers nach einer Operation so gerne zu einer Blutung neigt.

II. Thrombocyten.

Mit der Begründung des oben Gesagten weisen die Thrombocyten in Neuf er's Untersuchungen nach der Operation in 13 Fällen eine Verminderung auf, die allerdings nur eine geringgradige ist. Vergleicht man die Thrombocytenfenkung mit der Erythrocytenfenkung, d. h. bestimmt man die relativen Thrombocytenwerte pro 1000 Erythrocyten, so findet man diese im Gegensatz zu den absoluten Werten erhöht. Bei allen übrigen Fällen weisen die Blutplättchen schon bei der ersten postoperativen Untersuchung eine nicht unbeträchtliche Erhöhung auf. Neben zahlenmäßigen Verschiebungen zeigen die Blutplättchen auch qualitative Veränderungen. Je höher die Thrombocytenwerte liegen, umso ausgeprägter sind diese, und zwar bei allen Operationen. Es treten zwerg- und riesenförmige, keulenförmige, geschwänzte, abgeplattete und andere Formen auf. Jedenfalls variiert die Färbbarkeit des Protoplasmas abnorm stark.

III. Die Gerinnungszeit,

deren physiologische Schwankungsbreite zwischen 4 und 6 Minuten liegt, ist bei 26 Fällen als normal anzusehen, hingegen bei 10 Fällen verlängert bis auf einen Durchschnitt von 7,9 Minuten.

Nach diesen Auswertungen der Untersuchungen kommt Neuf er zu dem Schluß, daß sich die Folgeerscheinungen bei Magenoperationen Ulcus-Kranker nicht von denen anderer Operationen unterscheiden. In diesem Sinne haben sich auch keine Anhaltspunkte für eventuell vorhandene eudogene Umstimmungen Ulcus-Kranker finden lassen, weshalb Neuf er zu dem Schluß kommt, daß Nachblutungen durch örtlich bedingte Faktoren verursacht sein müssen.

Bei der kritischen Betrachtung der Ergebnisse und Untersuchungen Neuf er's bezüglich der Fragestellung unseres Themas muß aber doch einiges gesagt werden, was die Deutung der Arbeit Neuf er's in ein anderes Licht zu setzen vermag. Es wurden alle Magenoperationen untersucht, die damals in der Chirurgischen Klinik vorkamen, und zum Vergleich hierzu auch eine Anzahl anderer chirurgischer Eingriffe. Bei diesen Fällen hat es nirgends eine Nachblutung gegeben, und insofern mag die Deutung der Ergebnisse berechtigt sein, als es nicht angängig ist, bei Ulcus-Kranken mit einer gewissen notwendigen Veränderung des Blutes im Sinne einer Leukopenie und Thrombopenie zu rechnen. Diese Frage, die K r a b b e l seinen Kollegen stellte, mag als negativ beantwortet gelten. Aber dies ist nicht allein das Problem K r a b b e l's gewesen; er hat einen gewissen Zusammenhang zwischen der allgemeinen körperlichen Konstitution und eintretenden Nachblutungen vermutet, und hat nachdrücklich darauf hingewiesen, daß er in der Hauptsache die Möglichkeiten zu einer Nachblutung bei Kranken mit einer ausgesprochenen Labilität des Gefäßsystems vermute. Das Problem, das K r a b b e l aufgerollt hat, ist demnach mit Reihen-Untersuchungen an Ulcus-Kranken durchaus nicht als gelöst zu betrachten; im Gegenteil, nachdem man durch Neuf er's Arbeit gesehen hat, daß von einer Thrombopenie und Leukopenie, bzw. einer charakteristischen Veränderung des Blutes überhaupt im Allgemeinen nicht die Rede sein kann, ist dadurch nur der erste Schritt in einer Reihe von weiteren Untersuchungen getan. Das, was nun zu tun wäre, ist eine genaue Erforschung der Blutverhältnisse bei solchen Ulcus-Kranken, die nach einer Operation tatsächlich mit einer Nachblutung reagiert haben, außerdem eine Aufstellung eventueller Konstitutionsanomalien bei solchen Kranken. Erst dann, wenn man positive oder negative Ergebnisse in dieser Richtung gefunden hat, läßt sich das Problem als erledigt betrachten.

Und noch eins verdient Beachtung, das ist das Mißverhältnis zwischen den Untersuchungen Neuf er's und denen der beiden Russen S s o k o l o f f und G l a d y r e w s k y, die sich ebenfalls mit Blutveränderungen nach Operationen befaßt haben. Leider sind

ihre Ergebnisse im Original nicht zugänglich, da sie nur in russischer Sprache erschienen sind. Das Wesentliche ist durch ein Referat bekannt und bereits früher erwähnt worden. Wenn auch ihre Untersuchungen bereits am Tage der Operation begannen, im Gegensatz zu Neufser, der erstmalig am vierten Tag die Blutprüfung begann, so ist doch nicht anzunehmen, daß darauf allein der Widerspruch beruht. Es bleibt nichts anderes übrig, als mehr denn je den Abschluß dieses Problems in Frage zu stellen.

Im Vorhergehenden hat sich ergeben, daß viele Autoren ihre Ansicht, daß die Nahtstelle geblutet habe, durch die nachfolgende Sektion bzw. durch Relaparatomie beweisen zu können glauben. Schloffer sagt dazu mit Recht, daß es nicht so leicht sei, bei einer Sektion den sicheren Nachweis der Quelle der Blutung zu führen. Wenn daher bei einer Sektion an der Nahtstelle nichts gefunden wird, so darf daraus nicht der Schluß gezogen werden, daß eine andere Ursache ausfindig gemacht werden müsse, als das Bluten aus einem nicht unterbundenen Gefäß. Schloffer hat zur Zeit seiner Untersuchungen von den erst später bekannt gewordenen Theorien Krabbel's und anderer über endogene Momente noch nichts gewußt, hat so also nur zwischen den beiden Möglichkeiten der Ulcus-Blutung und der Naht-Blutung schwanken können. Trotzdem sind aber einige seiner Mitteilungen für die zuletzt erwähnte Fragestellung des Problems wesentlich. Die schon erwähnte Unmöglichkeit, an der Nahtstelle etwas Beweisendes für eine stattgefundene Blutung zu finden, hat mit als Begründung dazu gedient, die Quelle der Blutung in anderen Ursachen zu suchen. Das wird von Schloffer bestritten, der 6 Fälle mit schwerster Nachblutung nach Magen-Duodenal-Operationen erlebte. 2 der Patienten starben, von den 4 anderen wurde bei dreien eine Relaparatomie gemacht; das Ergebnis der 2 Sektionen dient Schloffer als Begründung seiner Annahme über die Entstehung. Bei dem ersten Patienten fanden sich sofort offene Gefäße innerhalb der Naht, beim zweiten konnten sie erst nach längerem bewußten Suchen gefunden werden: es ließ sich in einem Winkel der Anastomose Blut aus zwei offenen Gefäßen herauspressen. Als Erklärung zieht Schloffer eine sehr eindringliche

Möglichkeit heran. Er meint, die Nähte der inneren Nahtreihe an der Stelle der Anastomose oder an der Verschlusnaht könnten nicht eng genug sein, oder nicht so gelegen haben, daß nicht doch noch ein größeres Gefäß trotz angelegter Unterbindung unverflossen gewesen sein könnte. Ein anderes Mal war vielleicht der Faden der inneren Nahtreihe nicht genügend angezogen worden, und wieder ein anderes Mal muß man daran denken, daß der Faden allmählich durchgeschnitten hat und dadurch locker geworden ist, und daß so ein anfangs komprimiert gewesenes aber nicht thrombosiertes oder durch Verdauung des Thrombus wieder durchgängig gewordenes Gefäß geblutet hat. Namentlich der letzte angeführte Grund scheint sehr einleuchtend zu sein und bisher noch von keinem einer eingehenden Prüfung unterzogen worden. Denn, wenn trotz genauester Erfassung aller kleinsten Gefäße die Möglichkeit besteht, daß sich eine mit äußerster Mühe angelegte Naht lockern kann, dann erscheinen alle in ihrer Ursache so rätselhaften Nachblutungen in einem durchaus anderen Licht; man müßte also zur Klärung der Frage verlangen, daß bei jeder wegen einer Nachblutung angelegten Relaparatomie auf den genauen Zustand der Naht in ihren einzelnen Schlingen geachtet werden müsse. Erst eine große Anzahl von diesbezüglichen Ergebnissen kann dann einer Wertung unterzogen werden.

Andere Ursachen der Nachblutung.

Man hat festgestellt, daß nach Operationen im Abdomen — auch solchen am Magen — kurz nachher Magenblutungen auftreten, die jedoch, was speziell die Magenoperationen betrifft, mit der eigentlichen Operation bzw. deren Ursache nichts gemeinsam hatten, was auch weiterhin durch die Beobachtung erhärtet wurde, daß solche Blutungen auch nach anderen Operationen, z. B. solchen am Ellenbogen, auftraten. Uns interessiert hierbei die Tatsache, daß bei Magenoperierten die Möglichkeit einer Nachblutung besteht, ohne daß hierzu ein Zusammenhang mit der Magenoperation selbst gefunden werden könnte.

Wenn man Magenblutungen nach Operationen in der Bauchhöhle erlebt, wird man zunächst stets an ein Magengeschwür

denken. Man muß aber stets die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß die Blutungen mit der vorangegangenen Operation in irgendeiner Beziehung stehen. E i s e l s b e r g hat solche Magenblutungen nach Operationen nur in der Bauchhöhle bemerkt und hat angenommen, daß es sich dabei um Embolien in der Magenwand handele. Auch H a u g h konnte noch 1913 die Frage aufwerfen, warum solche Schädigungen fast ausschließlich bei Operationen im Bereich des Abdomens beobachtet würden. K o k o r i s - Athen teilt einen Fall mit, bei dem nach einer sectio alta bei einem dreijährigen Kinde drei Tage nach der sonst gut verlaufenen Operation eine schwere Magenblutung mit tödlichem Ausgang einsetzte.

Im weiteren Verlauf hat dann F e n k n e r mehrfach auch nach anderen Operationen nachträgliche Magenblutungen erlebt, und im Anschluß daran genau auf Magenblutungen nach Operationen geachtet. Er fand dabei unter rund 300 nicht am Magen Operierten 12 mal makroskopisch und 28 mal chemisch nachweisbares Blut im Erbrochenen. Weiter liegt dann ein Bericht über zwei Fälle des Russen R e t n e r vor, der nach Operationen außerhalb der Bauchhöhle schwerste Magenblutungen erlebte, und zwar nach der Operation einer epigastrischen Hernie und einer Wanderniere. In beiden Fällen war ein Ulcus klinisch nicht nachzuweisen.

Die erhebliche Anzahl dieser Fälle ergibt die Notwendigkeit der Annahme, daß der Magen bei den verschiedensten Operationen mit einer Blutung reagieren kann, und daß man also bei einer Nachblutung nach einer Magenoperation unbedingt auch dieselben Gründe in den Bereich der Betrachtung ziehen muß, die bei anderen Operationen zu einer Magenblutung führen können.

Wenn man bei einer Nachblutung einer Magenoperation die Gründe hierzu zunächst nicht als solche allgemeiner Natur sieht, dann liegt das darin begründet, daß man natürlich in erster Linie an ein blutendes Ulcus, im Folgenden an eine Nahtinsuffizienz denkt; F e n k n e r hat sich im Anschluß an seine Beobachtungen dann bemüht, die verwickelten Möglichkeiten klarzulegen, die zu einer solchen Blutung aus dem Magen führen können. Zunächst zwei seiner charakteristischsten Fälle:

1. Ein dreißigjähriger Mann geriet im Januar 1929 mit dem Ellenbogen zwischen Eisenbahnpußer. Die sehr schwere Verletzung machte mehrere Operationen nötig, die alle in Narkose gut überstanden wurden. Im September 1929 sollte als letzte Operation eine Synostose der Unterarmknochen entfernt werden. Die Operation war schwierig und dauerte etwa eine Stunde. Verwundet wurde wie immer Chloräthyl zu Beginn, dann Äther. Er hatte bisher alle Narkosen gut überstanden und sich überhaupt gut erholt, so daß keine Bedenken gegen eine weitere Narkose bestanden. Die Operation verlief gut. Nach ihr traten keine Temperaturerhöhungen ein, jedoch fing er am zweiten Tage an, Blut zu brechen; der Puls ging immer höher, am vierten Tage 140, sank dann wieder ab; der Kranke, der nun auch nichts mehr erbrach, verfiel immer mehr und starb am sechsten Tage. Die Sektion ergab diffuse Magenblutungen, besonders im Fundus, sonst nichts, auch keine ulcera. Die inneren Organe wurden dem Pathologischen Institut Breslau eingefandt, das außer dem Erwähnten nur eine mäßige Verfettung im Herzmuskel, in Leber und Nieren feststellte.
2. August Puff, 58 Jahre, wurde bei einem politischen Streit von feinen Parteigenossen in den Bauch geschossen. Darm mehrfach durchschossen, wurde genäht. Temperatur zunächst hoch, dann fallend. Puls am zweiten Tage 120, am dritten Tage 138. In der Nacht darauf Tod. Die Sektion ergab keine Peritonitis, alle Darmnähte hielten gut. Sonst kein Befund. F e n k n e r wohnte der Sektion bei; nach dem bis dahin negativen Ergebnis machte er auf Grund seiner Beobachtungen darauf aufmerksam, daß man den Magenfundus nachsehen solle. Es wurde eine ausgedehnte diffuse Blutung gefunden.

Das Auffallendste an diesen Sektionsergebnissen ist, daß die Magenblutungen sich hauptsächlich im Fundus fanden. Dies spricht auch dagegen, daß sie aus Magengeschwüren stammen, die sich ja fast ausschließlich im Pylorusteil befinden.

Die Versuche zur Aufklärung der Ursachen dieser Blutungen bereiten große Schwierigkeiten. F e n k n e r hat angenommen, daß eine Schädigung des vegetativen Nervensystems verantwortlich gemacht werden müsse; die Wirkungen im vegetativen System können nach ihm auf verschiedene Art zustande kommen:

1. Durch direkte Reizung vegetativer Zentren oder lokaler Ganglien.
2. Giftwirkungen.
 - a) über die vegetativen Nerven
 - aa) Narkose bb) Histamin.
 - b) Direkt auf elektrolytischem Wege.
3. Vom Zentralnervensystem aus.

Ad. 1.

Eine Schädigung der Magenschleimhaut durch direkte Reizung vegetativer Zentren oder lokaler Ganglien erscheint nach Tierversuchen durchaus möglich. P u h l und B r o d e r s e n haben — zu allerdings anderen Zwecken — Versuche an Hunden gemacht, bei denen sie auf Grund längerer Hungerzeit Blutungen und Erosionen immer im unteren Drittel der Fundus Schleimhaut fanden. Den gleichen Befund erhielten sie auch beim Fistelhund, der mit Sonde gefüttert wurde, aber noch Reizungen des Magens mit Histamin erhielt. Sie stellten fest, daß die Erosionen im Magen aus hämorrhagischer Nekrose entstanden waren.

Weiterhin fand man Erosionen im Magenfundus nach Versuchen, die man anstellte, um künstlich Geschwüre hervorzurufen, wozu T a l m a und L i c h t e n f e i n elektrische Reizung des Vagus anwandten und neben dem gewünschten Erfolg, dem Ulcus, auch Blutungen des Fundus erzielten. S t a h n k e hat bewiesen, daß der Vagusreiz vermehrte Blutfülle des Magens hervorruft. Auf diese Blutüberfüllung reagiert vorzugsweise das Fundusgebiet mit Blutung, und wenn wir uns hierbei vor Augen halten, daß die Zellen im Fundus sehr zart und vergänglich sind, so können wir die Ursache der vermehrten Schädlichkeitswirkung gerade bei der Funduszelle in deren geringerer Widerstandsfähigkeit sehen.

Die genannten Urfachen — Hungern und direkte Reizung — des vegetativen Systems — führen also zu einer Schädigung der lokalen Zentren.

Ad. 2.

a) Durch pharmakologische Versuche an Hunden hat man feststellen können, daß Gift in nicht tödlichen Dosen eine Wirkung auf die Fundus Schleimhaut ausübt, die sich in Blutungen und Zerfallsercheinungen bemerkbar macht. Dies gibt Veranlassung, an eine analoge Wirkung der Vergiftung durch die Inhalationsnarkose zu denken, die sich gelegentlich in einer diffusen Blutung aus dem Fundusteil äußern kann. Trotz der großen Wahrscheinlichkeit und des im Folgenden angegebenen hohen Prozentsatzes der Blutungen aus der Magenschleimhaut nach Operationen kann eine Sicherheit bezüglich der Schuldfrage der Narkose nicht gegeben werden. Die Frage ist zu wenig durchforcht, und das Folgende stellt dar, inwieweit F e n k n e r die Möglichkeit einer Schuldbeteiligung der Narkose sieht.

Der Einfluß der Narkose auf das vegetative System kann an der Reaktion der Pupille beobachtet werden, bzw. an dem Wechselspiel zwischen Oculomotorius und Sympathicus. Bei ganz tiefer Narkose wird die Pupille klein und reaktionslos. Dies kann auf einem Reiz des Oculomotorius oder auf Lähmung der Sympathicus beruhen. Wenn man in der Narkose noch etwas weitergeht, wird die Pupille plötzlich wieder weit, ein Beweis dafür, daß jetzt der Oculomotorius gelähmt ist und daß er vorher, bei enger Pupille, gereizt war. Die Wirkung des Sympathicus geht zunächst noch weiter, doch tritt auch hier schließlich Lähmung ein. Es tritt also demnach zunächst ein Reizstadium im parasymphatischen (Oculomotorius) System ein, dann eine Lähmung und schließlich auch eine Lähmung im sympathischen System. Dafür, daß die Erscheinungen an der Pupille bezüglich ihrer Deutung auch auf das übrige vegetative System bezogen werden können, sprechen eine ganze Anzahl von sekundären Schädigungen der Narkose: so der plötzliche Herztod durch Einwirkung des Chloroformgehalts des Bluts auf die Herzganglien; der Vagus wird gelähmt, die hemmenden Momente

der Reizbildung im Herzen fallen fort, die Folge ist Kammerflimmern mit tödlichem Ausgang. Sodann die Behinderungen der Darmtätigkeit, die als beinahe regelmäßig nach Operationen bezeichnet werden können; die selteneren Blasenlähmungen usw. Wegen der nicht immer zugleich auftretenden Schädigungen kann angenommen werden, daß das vegetative System nicht in feinen Zentren, sondern in den organeigenen Ganglien angegriffen wird. Dies betont P a y r , der außerdem beobachtet hat, daß von allen Narkotischädigungen die des Magens am langsamsten zurückgeht und daraus eine Schädigung der organeigenen Ganglien deduziert. Wesentlich für unsere Betrachtung ist die Tatsache, daß der Gang der Lähmungen — vom Großhirn beginnend und an den vegetativen Zentren endigend — nicht immer beibehalten wird. Der Grund hierzu liegt entweder in der individuellen Verschiedenheit der vegetativen Zentren von anderen Hirnteilen, oder darin, daß lokale Zentren (Organganglien) vom Narkotikum stärker angegriffen werden, als die vegetativen zentralen Zentren. Es würde also so eine vegetative Schädigung gesetzt werden können, ohne daß man bei der Narkose durch Störungen darauf aufmerksam würde. Beweisend hierfür dürfte ein Fall von tödlicher Chloräthylvergiftung sein, den S e i t z berichtet. Gelegentlich einer Zahnextraktion wurde zur Betäubung höchstens 2 g Chloräthyl auf das Zahnfleisch gespritzt. „Das 55jährige zarte, schwächliche und ängstliche skoliotische Fräulein kollabierte plötzlich beim Ausspülen des Mundes nach vollendeter Zahnextraktion und starb nach 17stündiger Agonie unter zunehmender Abschwächung der Atem- und Herztätigkeit. Das beim Aufsprayen eingeatmete Chloräthyl wurde augenscheinlich durch eine Lähmung der Hirnrinde und der Obloganta tödlich.“

Ein Reiz des Vagus wirkt auf den Magen peristaltikerregend, außerdem sekretionsfördernd. Da der Vagus auch an der parasympathischen Interversion der Gefäße beteiligt ist, und da S t a h n k e an Experimenten nachgewiesen hat, daß ein Reiz des Vagus Blutüberfüllung — namentlich im Fundusteil — des Magens bewirkt, bei einer Lähmung durch Narkotika also die sympathische Innervation der Gefäße, die Vasokonstriktoren, die Oberhand bekommen, fällt damit die Annahme, daß eine Vaguslähmung durch Nar-

kofe Ursache einer Blutung im Magen sein könnte, weg. Zum wenigsten wird eine Vagusbeteiligung sehr fragwürdig. F e n k n e r gibt eine Statistik über Operationen, bei denen nachträglich Erbrochenes auf Blut untersucht wurde. Es sind dabei die verschiedenen Narkosearten zu berücksichtigen:

1. Morphinum und Äther:	44 Fälle
mit Blut:	75 %
makr. Blut:	0 %
2. Nur Äther:	67 Fälle
mit Blut:	88,6 %
makr. Blut:	4,5 %
3. Chloräthyl-Äther:	282 Fälle
mit Blut:	38 %
markr. Blut:	7,9 %

Bei der reinen Äther- und der mit Morphinum verbundenen Äther-Narkose trat in der großen Mehrzahl der Fälle Blut im Erbrochenen auf; dies ist auffällig, findet aber seine Erklärung im Folgenden: bei allen Narkosen mit starkem Äther-Gehalt tritt das Exzitationsstadium stärker hervor; Atemstörung, Blauwerden, und schaumiges Bronchialsekret ist viel häufiger als nach Chloräthyleinleitung der Narkose. Nun muß man annehmen, daß bei der vorzugsweise Äther-Narkose viel von dem Bronchialsekret verschluckt wird, in den Magen gelangt, und sich später im Erbrochenen befindet. Das Bronchialsekret enthält nun viel Eiterleukozyten, und beim chemischen Nachweis des Blutes ergeben auch diese positiven Ausfall der sehr empfindlichen Benzidinprobe. Durch diese Tatsache werden bezüglich der Untersuchungen auf Magenblutungen nach Operationen diejenigen mit vorzugsweise Äthernarkose entwertet. Einigermaßen wertvoll bleiben nur die Fälle mit makroskopischem Blut, denn dies kann mit leukozytenhaltigem Bronchialsekret nicht verwechselt werden. Hiernach sind nach Chloräthyl fast doppelt soviel Fälle mit Blut eingetreten, als nach reinem Äther (wobei allerdings die geringe Zahl der reinen Ätherfälle zu berücksichtigen ist). Dies ließe an sich den Verdacht aufkommen, daß das Chloräthyl mit seiner geringeren Narkosebreite eine Rolle spielen könnte, eher eine

Vergiftung im angegebenen Sinne hervorrufen könnte. Dann müßten auch die anderen Narkoseschädigungen der beiden Betäubungsarten analoge Zahlen aufweisen; dadurch würde dann mit Recht auf eine Schädigung des vegetativen Systems geschlossen werden können. Ein Vergleich der Blasenlähmung hierbei ergibt aber, daß die reine Äthernarkose 7,5%, die Chloräthylnarkose dagegen nur 3,2% aller Fälle ergeben hat, die Blasenschädigung also im genau entgegengesetzten Verhältnis zur Magenblutung steht.

Nach diesen durchaus verworrenen Ergebnissen der Untersuchung über die Narkosewirkung ist es abzulehnen, daß diese die Magenblutungen erzeugt hätten.

Ähnlich wie mit der Narkose verhält es sich mit der Wirkung des Histamins. Dieses Gift tritt nach Operationen als Zerfallsprodukt von gequetschtem Gewebe im Körper auf. Man könnte daran denken, es für die postoperativen Magenblutungen verantwortlich zu machen, wenn auch der letzte Beweis hierzu noch fehlt. Dafür sprechen aber noch folgende Tatsachen: Zunächst wurde Histamin bei den schon erwähnten Hundeversuchen mit bekanntem Erfolg benutzt; dann hat es auch des öfteren zur Erzeugung von Schockzuständen mit Lähmungen im Vasomotorenzentrum gedient. (Schock wurde bei den von F e n k n e r beobachteten Magenblutungen nach Operationen fast stets als Begleiterscheinung gefunden.) Und dann wurden solche Schockzustände auch künstlich hervorgerufen durch Einspritzung von bei Quetschungen oder Verbrennungen entstandenen Gewebszerfallsprodukten. Es ist zwar nicht gelungen, in diesen Zerfallsprodukten Histamin nachzuweisen, aber die Analogie der Folgezustände dürfte doch für dieselbe Ursache der Wirkung sprechen.

F e n k n e r zieht auch noch eine andere, häufige Krankheit als Parallele zu dieser Beobachtung heran: Die Tubargravidität. Hierbei ist der Krankheitsverlauf meist so, daß die Frauen bei anscheinend völliger Gesundheit einen plötzlichen Schmerz verspüren, dem nach meist einigen Tagen oder doch kaum früher als nach 24 Stunden ein schwerer Kollaps folgt. Die Frauen sind bläulich, blaß und fast pulslos. Man hat den Eindruck, daß sie fast verblutet wären. Wenn F e n k n e r behaupten zu dürfen glaubt, daß es sich

hierbei weniger um Anämie als um einen Histaminschock, herbeigeführt durch die große Menge des in der Bauchhöhle befindlichen, sich langsam zeretzenden Blutes handelt, so gewinnt seine Annahme dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß die von ihm auf Grund dieser Vermutung ausgeführten Therapie vollen Erfolg aufweist: er hat nie eine Bluttransfusion vorgenommen, sondern lediglich Kochsalz eingespritzt, und hauptsächlich für eine baldige Entfernung des Blutes aus der Bauchhöhle Sorge getragen. Er hat so nie eine Patientin verloren, sie erholten sich auffallend schnell, und ein langdauerndes Blässein wurde bei ihnen nie beobachtet, ganz im Gegensatz zu den Fällen, bei denen die Frau infolge eines Aborts längere Zeit nach außen geblutet hatten; auch diese erscheinen von Anfang an blaß und blutleer, aber nie bläulich und kollabiert, dagegen behielten sie ihr anämisches Aussehen wochenlang, während die Tubargraviden sich sehr schnell erholten. F e n k n e r sieht demnach den Kollaps bei Tubargravidität als einen Histaminschock an.

Wenn nun Wundsekret und Wundblut, überhaupt Zerfallsprodukte bei Operation, einerseits den Schock, andererseits auch Magenblutungen herbeigeführt haben können, so müßte man erwarten, daß in den Fällen, in denen der Schock durch Resorption von Blut nachweislich auftritt, also bei Tubengraviden, auch öfter Magenblutungen beobachtet wurden. Dies ist jedoch nie der Fall gewesen. Es wäre demnach falsch, Histaminwirkungen für Magenblutungen verantwortlich machen zu wollen. Genau so falsch wäre es jedoch auch, sie vollständig von der Möglichkeit auszuschließen, da gewiß noch nicht bei einem genügend großen Prozentsatz von Fällen darauf geachtet worden ist.

ad 2 b.

Man rechnet neuerdings zum vegetativen System nach Veröffentlichung Z o n d e c k s nicht nur die vegetativen Nerven, sondern auch die Reaktionen an den Zellen selbst und die zwischen diesen und den Körperflüssigkeiten. Wie zwischen sympathischem und parasympathischem System wurde auch zwischen den elektrochemischen Wirkungen z. B. des Kalium und des Calcium ein Gegenpiel

festgestellt. Das physiologische Geschehen beruht auf Schwankungen der Acidität, jedoch hat sich ergeben, daß ein Übersteigen des physiologischen Grades dieser Schwankungen schwere Gefundheitschädigung bedeutet. Die Veranlassung zur Änderung des elektrolytischen Zustandes der Zellen geht einmal von den zentralen Ganglien des vegetativen Systems aus, sie kann aber auch von den im Rückenmark liegenden Zentren erfolgen, und schließlich können auch die organeigenen Ganglien (Herzganglien, Auerbach'scher Plexus) die Erregung auslösen. Die einzelnen Zentren sind aber immer spezifisch eingestellt, so etwa das Atemzentrum in der Medulla auf den Kohlenäureüberschuß des Blutes. Diese unterschiedliche Empfindlichkeit beschränkt sich jedoch nicht nur auf die zentralen Ganglien, sondern sie wurde auch in den zwischengeschalteten vegetativen Ganglien und in den organeigenen Ganglien nachgewiesen. Den sicheren Beweis der spezifischen Reaktionsempfindlichkeit vorhandener organeigener Ganglien ergaben Versuche, die man mit in Kaninchenaugen transplantierte Uteruschleimhaut anstellte. Obwohl losgelöst aus dem eigentlichen Zellverband und damit einer Nur-Reizmöglichkeit vom Zentrum her entzogen, zeigte die transplantierte Schleimhaut zur Brunstzeit dieselben Schwellungsercheinungen wie die übrige Uteruschleimhaut, sogar die Abstoßung eines Schleimhautanteils nach erfolgtem Wurf. Es wirkte also hierbei das im Blut kreisende Hormon auf die organeigenen Ganglien der transplantierten Schleimhaut, und diese ihrerseits setzte den Reiz zur Veränderung.

Und nun diese Tatsache zu einer Erklärung unseres Problems heranziehen zu können, um also zu beweisen, daß durch Änderung der elektrolytischen Verhältnisse eine Schädigung der Magenzellen eingetreten sein könnte, die die Magenblutungen erklärten, müßte man nachweisen, daß die elektrolytischen Verhältnisse der Magen-zellen bei Nachblutungs-Kranken verändert waren. An Zellen selbst solche Veränderungen nachzuweisen, ist bis heute überhaupt noch nicht gelungen, wohl aber am Blut. Straub sagt, daß bei jeder Narkose eine Acidose im Blut vorhanden sei, und Heidecker hat bei 232 Patienten Acidoseuntersuchungen gemacht, und bei 60,9% das Auftreten der Acidose nach Operationen fest-

stellen können, und zwar nach Operationen in Narkose und solchen in Lokalanästhesie. Das letztere schließt aus, daß man die Narkose verantwortlich machen könnte. Es kommt noch ein Fall hinzu, bei dem Heidecker eine Acidose im Blut auftreten sah, wobei aber die Operation gar nicht ausgeführt wurde, weil sie aus irgendeinem äußeren Grunde abgesetzt werden mußte. Das beweist, daß weder die Operation noch die Narkose als solche die Acidose veranlaßt haben, sondern daß auch die Angst vor der Narkose und der Operation schon zur Acidose führen kann.

Der Nachweis einer Änderung der elektrolytischen Verhältnisse der Magenzellen hat also noch nicht geführt werden können. Die Feststellungen über die Aciditätsveränderungen des Blutes lehren, daß sie aus verschiedenen Ursachen entstehen können. Jetzt sind sie also ein Zeichen dafür, daß lebenswichtige Funktionen eine erhebliche Störung erfahren haben. Demnach kann eine Acidose zwar nicht als Ursache für die Magenblutungen angesehen werden, wohl kann sie als ein Symptom gelten, das unter denselben Verhältnissen wie diese eintritt. Durch die Acidose wird aber auch eine veränderte Zellfunktion veranlaßt. Das folgt aus der Veränderung, die in den Reaktionen auf Reizungen vegetativer Nerven eintritt, wenn die Acidose geändert ist. Die Acidose ist also ein Zustand, in dem die an den Körper herantretenden Reizungen andere als sonst aufgenommen werden, d. h. die Acidose läuft auf eine Änderung der Widerstandskraft hinaus. Dem entspricht es auch, daß diejenigen, bei denen eine veränderte Acidose nach der Narkose gefunden wurde, auch unter den Folgen der Narkose mehr zu leiden hatten als andere.

ad 3.

Im vorhergehenden wurde ein Fall erwähnt, bei dem ein Patient ohne Narkose und ohne Operation scheinbar nur aus Angst davor mit einer Acidose des Blutes reagierte. Dazu kommt noch eine diesem Fall in der Beurteilung gleichzuachtende Krankengeschichte, die Fenkner angibt. Eine Frau mit mehreren Kindern fühlt sich wieder schwanger, ihr Mann liegt seit Monaten im Krankenhaus. Sie selbst ist herzkrank und möchte die Schwanger-

schaft gerne los sein. Auf Grund ihrer Herzkrankheit wurde dann die Unterbrechung vorgenommen in Form einer in einer Sitzung durchgeführten Curette mit kurz dauernder Narkose. Die Frau erbrach noch am Tage der Operation makroskopisch nachweisbares Blut. Der weitere Verlauf war ungestört. Es wurde schon gesagt, daß von einer Acidose auf die Änderung der Widerstandskraft geschlossen werden kann. Man muß nun die Wechselbeziehungen zwischen zentralem und vegetativem System beachten, um dann weiterhin den Schluß ziehen zu können, daß Acidose und Schwächung der Widerstandskraft urfächlich miteinander zusammenhängen, wobei die Frage, welche der beiden Erscheinungen primär vorhanden ist, gewiß nicht uninteressant, aber wohl wesentlich gleichgültig bleiben darf. Durch psychische Momente, etwa Schreck oder Angst werden Pupille, Darm, Speichel, Haarpapillen, Schweiß, Galle usw. entscheidend in ihrer Tätigkeit beeinflusst. Der Zusammenhang zwischen zentralem und vegetativem Nervensystem stellt sich hierbei so dar, daß das vegetative System vom zentralen abhängig ist. Es läßt sich aber auch die Möglichkeit einer Abhängigkeit des zentralen Systems vor vegetativen einleuchtend machen; schwere Krankheiten setzen die Widerstandskraft herab. Wir haben gesehen, daß sich dies körperlich mit einer Veränderung der Acidität deckt. Bei solchen Zuständen herabgesetzter Widerstandskraft findet man aber auch immer eine veränderte Reaktionsfähigkeit auf die vorhergenannten Erregungszustände des zentralen Systems, also Schreck, Angst usw. Der Kranke fürchtet sich davor, alleine zu sein, Verbinden einer Wunde, das anfangs noch leicht ertragen wurde, wird mit zunehmender Dauer der Krankheit zu einem immer größeren Objekt der Furcht.

Daß der Einfluß des zentralen Nervensystems bei herabgesetzter Widerstandskraft das vegetative System zu schädigen imstande ist, darf angenommen werden, und so weiterhin eine Möglichkeit gesehen werden, wie bei einzelnen Patienten auch vornehmlich vom zentralen Nervensystem aus bedingt nach einer Operation der Magen mit einer Blutung reagieren kann.

Es wäre falsch, zu sagen, daß eine der genannten Urfachen alleine in der Lage wäre, eine Magenblutung hervorzurufen. Dazu

fehlen zu sehr eindeutige Belege — vielleicht nur deshalb, weil man bisher zu wenig sich mit einer solchen Deutung des Zustandekommens einer postoperativen Magenblutung beschäftigt hat. Die wenigen Untersuchungen und Beobachtungen, die bis jetzt vorliegen, berechtigen aber durchaus die Feststellung, die gleichzeitig das in diesem Abschnitt Gefagte noch einmal kurz zusammenfassen soll:

Es gibt nach Operationen — auch nach Magenoperationen — Blutungen im Magenfundus, die mit der Entstehung oder dem Vorhandensein von Magengeschwüren nichts zu tun haben. Es muß angenommen werden, daß diese Blutungen auf Grund einer Schädigung des vegetativen Systems zustandekommen. Wirkungen im vegetativen System können auf die allerverschiedenste Weise zustandekommen: Neben direkter Reizung vegetativer Zentren oder lokaler Ganglien kommen dafür auch Giftwirkungen in Frage, die sich entweder über die vegetativen Nerven oder direkt auf elektrolytischem Wege auf die Gewebe auswirken. Schließlich können alle diese Wirkungen auch vom zentralen Nervensystem ausgelöst werden.

Es ist nicht möglich, einen dieser Wege für die schweren Erscheinungen der Magenblutung ausschließlich verantwortlich zu machen. Die verschiedenen Wege summieren sich, und die deletäre Wirkung kommt dadurch zustande, daß bei Vorliegen einer oder mehrerer Schädigungen durch die beiden dazukommenden Schädigungen der Operation und Narkose das Maß der restlichen Widerstandskraft überschritten wird.

Die Anschauungen über die Ursachen der postoperativen Nachblutungen gehen, wie wir gesehen haben, weit auseinander. Am wenigsten Wahrscheinlichkeit hat F e c k n e r mit der Begründung in einem Operationstrauma. Die größte Möglichkeit der Entstehung ist in der Insuffizienz der Naht enthalten, wofür auch eine ganze Anzahl von Beweisen sprechen. Da diese Annahme auch die meisten Anhänger hat, ist im folgenden auch nur auf die Therapie der infolge einer Nahtinsuffizienz entstandenen Nachblutungen Rücksicht genommen worden.

Prophylaxe und Therapie.

Es ist ein großer Unterschied zu machen, ob man die Blutung chirurgisch angehen will, oder ob man versucht, durch andere, bekannte Blutstillungsmittel zu helfen. Wesentlich ist die genaue Klärung dieser Frage wegen des bedrohlichen Charakters einer jeden postoperativen Blutung: Die Fälle, wo solche Patienten trotz gut verlaufener Operation gestorben sind, sind nicht selten.

Es soll im folgenden kurz die Nahttechnik beschrieben werden, wie sie Flörcken, v. Haberer, Garrè und Enderlen ausführen, um einer Nachblutung schon prophylaktisch entgegenzuarbeiten. Im Prinzip wird jedes Gefäß für sich mit feiner, drehender Nadel umstochen, bevor das Lumen des Magens eröffnet wird. Die Technik im einzelnen ist folgende:

1. Bei Gastroenterostomie: nach richtiger Aneinanderlegung von Magen und Darm — jeder für sich auf einer Doyen'schen Klemme — fortlaufende hintere Serosa-Naht oder Knopfnähte mit feinem Zwirn, Incision der Serosa muscularis von Magen und Darm; jedes sichtbare Gefäß der Submucosa des Magens wird an zwei gegenüberlegenden Stellen mit einem Zwischenraum von etwa 3 bis 5 mm umstochen. Dann fortlaufende Naht der Muscularis von Magen und Darm, Eröffnung der Mucosa in der Linie der Umstechungen; Naht der Schleimhaut.

2. Refektion nach Billroth II: Nach Skelettierung des Magens und Durchtrennung des Duodenums werden Jejunumschlinge und Magen nach üblicher Armierung mit Klemmen richtig aneinandergelegt. Anlegen der hinteren Serosa-Naht, die hier stets mit Zwirnnopfnähten gemacht wird, Incision der Serosa und Muscularis von Magen und Darm, Umstechung der submucösen Magengefäße um Schnittrand der Muscularis nach der Serosa-Naht. Um nun auch die Gefäße der vorderen Nahtcircumferenz exakt zu versorgen, muß jetzt der bisher nach links herübergelegte Magen nach rechts geschlagen werden; Incision der Serosa und Muscularis entsprechen der vorderen Anastomosenhälfte. Wieder auch hier sorgfältige Umstechung eines jeden Gefäßes am Muscularischnittrand nach der

Klemme zu. Jetzt wird der Magen nach links zurückgelagert, fortlaufende Catgutnaht der Muscularis und Serosa, Eröffnung der Lumina, hintere Schleimhautnaht. Beim Abtragen des Magens vor der vorderen Schleimhautnaht hat der Assistent darauf zu achten, daß das Messer in richtiger Höhe die Schleimhaut durchtrennt, ohne daß Streifen der Serosa-Muscularis an der Mucosa-Schnittfläche hängen bleiben. Bei den Umstechungen kann es passieren, daß das Lumen des Magens durch den Stich eröffnet wird und Mageninhalt herausquillt; der Flüssigkeitsstrom hat aber gewöhnlich mit dem Knüpfen des Fadens ein Ende. Zweckmäßig ist aber dauernd eine Abfaugvorrichtung in Bereitschaft zu halten. Es folgt dann die vordere Naht als fortlaufende, durchgreifende Catgutnaht.

Hierbei könnte man einwenden, daß das Verfahren zu Ernährungsstörungen und damit zu Nekrosen und Nahtinsuffizienzen führen könne. Da aber an Hunderten von so operierten Fällen nichts derartiges gesehen wurde, kann diese Gefahr ausgeschaltet werden.

Wenn man diese Methode mit der ebenfalls heute noch oft geübten Technik vergleicht, wie sie Schmie den, Kirchner, Bircher und andere anwenden — sie beziehen die Gefäße in die fortlaufende, durchgreifende Naht mit ein — muß man sagen, daß durch sie die Prophylaxe einer Nachblutung weitgehend erreicht worden ist; tatsächlich haben auch alle Operationen seit exakter Anwendung dieser Methode keine Nachblutung in ihren Fällen mehr aufzuweisen, im Gegensatz zu den anderen, die keine gefonderte Umstechung ausführen.

Diese genaue Umstechung aller einzelnen Gefäße ist die einzige wirkfame Prophylaxe, die bei der Magenoperationen betrieben werden kann. Ist es aber erst einmal zu einer Nachblutung gekommen, dann setzt die große Menge der verschiedensten Mittel ein, die Blutung zum Stehen zu bringen.

Zur Bluttransfusion, um den drohenden Verfall des Körpers aufzuhalten, genügen gewöhnlich Mengen von 300—600 ccm, wobei der Wert nicht nur im Blutersatz, sondern auch in der haemostyptischen Wirkung des fremden Blutes gelegen ist. Man wird oft erleben, daß nach einer Transfusion wohl eine vorübergehende

Besserung eintritt, dann aber ein erneutes Blutbrechen einsetzt, das die Patienten gefährdet. In der Annahme, daß die Transfusion also nichts nütze, werden dann wohl meist neue Mittel versucht. Sehr lehrreich in dieser Beziehung dürfte aber ein Fall sein, den P o p p e r veröffentlicht hat. Er hat einem Patienten mit einer schweren postoperativen Nachblutung innerhalb von 17 Stunden 2½ Liter Blut eingespritzt, mit dem Erfolg, daß er aus seinem völlig moribunden Zustand in kürzester Zeit sich erholte. Dieser einmalige Versuch sollte wegen seines guten Ausganges zur Wiederholung in ähnlichen Fällen anregen, vielleicht daß sich dadurch eine wirkfame Therapie ohne Relaparatomie finden ließe.

Es ist bei dieser Art Therapie aber etwas zu bedenken: Der Patient ist nicht etwa gerettet worden durch die blutstillende Wirkung der Transfusion, da es ja trotz mehrfacher Einspritzungen dauernd weiter geblutet hat; vielmehr ist die Blutung von selbst zum Stehen gekommen, und es ist nur gelungen, durch dauernde Transfusionen den Patienten bis zu diesem Zeitpunkt am Leben zu erhalten. Es sind analoge Fälle von O t t e und D a h l g r e n beschrieben worden, auch hier ist daselbe geglückt. In einem Fall mag diese Therapie als die einzig wirklich lebensrettende angesehen werden, das ist dann, wenn das zurückgelassene Geschwür blutet. Dies festzustellen, ist aber nicht leicht, wenn nicht gar unmöglich; und deshalb soll man dann, wenn ein Geschwür zurückgelassen wurde, abwarten dürfen und mit sehr hohen Bluttransfusionen über die Gefahr des Exitus hinwegzukommen suchen. Ist aber das Geschwür entfernt, dann soll doch bei einer eintretenden Nachblutung möglichst bald die Relaparatomie gemacht werden, noch bevor der Patient durch starke Blutverluste geschwächt ist.

Es gibt aber eine ganze Menge von Patienten, bei denen der Operateur froh ist, wenn sie den Eingriff der Resektion gut überstanden haben; bei ihnen eine Relaparatomie im Falle einer Nachblutung vorzunehmen, ist nicht immer möglich. Und da wir gesehen haben, daß die Bluttransfusion nur zum Ersatz des verloren gegangenen Blutes dient, nicht aber zur Stillung, muß bei ihnen und bei solchen Fällen, wo wahrscheinlich das zurückgelassene Ulcus blutet, eine andere Therapie versucht werden, um die Blutung zum

Stehen zu bringen. Mittel hierzu sind in Mengen bekannt: Clauden, Gelatine, Serum, Kochsalz, um einige zu nennen.

Schleffinger empfiehlt Injektionen mit Pferdeferum, Payr glaubt auf Grund dreijähriger Praxis mit Jod sagen zu können, daß der Gesamtverlauf aller in Betracht kommenden Störungen postoperativer Art sich nach einer prophylaktischen Jodtinktur-Bepinselung günstiger gestalte.

Raufschke verfügt über neun Fälle, von postoperativen Blutungen nach Magenoperationen, die er alle mit intramuskulären Injektionen von Eigenblut behandelt hat. Infolge dieses prompten Erfolges hat er dann später schon während der Operation in solchen Fällen, wo die Möglichkeit einer Nachblutung bestand, schon prophylaktisch 10—20 ccm Eigenblut injizieren lassen, mit dem Erfolg, daß er keine Nachblutung mehr bei weiteren 46 Magenoperationen sah. Er ist von der prophylaktischen und therapeutischen Wirkung der Eigenblutinjektionen überzeugt.

Bei Gurewitsch haben sich therapeutisch in zwei Fällen intravenöse Ca-Injektionen ausgezeichnet bewährt; in einem anderen, fast moribunden Fall, bei dem die Ca-Injektion, Ergotin, Gelatine, Eis usw. alle versagten, wirkten abwechselnde Spülungen mit warmem und kaltem Wasser lebensrettend, indem sie zur Hebung des Tonus der Magenwand Veranlassung gegeben hätten.

Zwei weitere Mittel gibt Krämer an: Vivokoll und Stryphon. Vivokoll haftet nur auf Wundflächen, nicht auf intakten Schleimhäuten; Stryphon, eine Vorstufe des Suprarenins, hat nicht wie dieses die Wirkung, in kurzer Zeit den gefäßverengenden Einfluß aufzugeben. Mit Stryphon getränkte Gaze ist bei Krecke seit mehreren Jahren in Gebrauch.

Die therapeutische Milzbestrahlung ist lange bekannt; Mertz berichtet über 22 Fälle von gynäkologischen Blutungen, die mit Milzbestrahlung behandelt worden sind; ein Dauererfolg wurde in keinem Falle erzielt, wohl ließ sich bei einem Teil der Patientinnen ein Sistieren der Blutung für einige Zeit erreichen; für unsere Fälle käme die Milzbestrahlung demnach nur als Zusatz zu anderen Therapien in Frage. Die blutstillende Wirkung der Milzbestrahlung erklärt Mertz aus der großen Strahlenempfindlichkeit des lym-

phatischen Gewebes, durch die es zu einem gesteigerten Zellzerfall komme, der wiederum eine Vermehrung des proteolytischen Ferments und eine Anreicherung der Muttersubstanzen des Thrombins zur Folge habe.

Zusammenfassung.

Abschließend können wir über das Zustandekommen von postoperativen Magenblutungen folgendes sagen:

1. Das zurückgelassene Geschwür kann bluten.
2. Die Magennaht kann trotz exakter Technik in den ersten Tagen nach der Operation undicht werden, so daß nur eine in dieser Richtung gehende Prophylaxe mit Sicherheit eine Nachblutung ausschließen kann.
3. Es besteht die Möglichkeit, daß es durch das Operations-trauma zu einer noch unbekannten Art der Schädigung kommt, die eine diffuse Blutung aus der Magenschleimhaut, nicht aus der Wunde, bewirkt.

Die größte Wahrscheinlichkeit und den höchsten Prozentsatz haben die Blutungen aus der Naht, weshalb therapeutisch und prophylaktisch der guten Ausführung der Naht besondere Beachtung geschenkt werden muß.

Literatur-Angaben.

- Wölfler: Prof. Billroth's Pylorusresektionen. Wien 1881.
- v. Hacker: Die Magenoperationen an Prof. Billroth's Klinik von 1830 bis 1885. Wien 1886.
- Bausch: Endresultate der Gastroenterostomie bei Magengeschwüren. Dtsch. Ztschr. Chir. 144.
- Krecke: Über Magenblutung nach Gastroenterostomie. Dtsch. Zeitschr. Chir. 172.
- v. Haberer: Meine Technik der Magenresektion. Münch. Med. Wochenschr. 1933 Nr. 34.
- Johnson: Verschlussnähte am Magen-Darm-Kanal. Zbl. Chir. 46.
- Kulenkampff: Gegen die Schleimhautnaht bei Magen-Darm-Operationen. Chirurg 1933.
- Podras: Über die Naht der Schleimhäute. Zbl. Chir. 22.
- Krabbel: Zur Beurteilung der Nachblutung nach Gastroenterostomien. Zbl. Chir. 1926 Nr. 17. Zbl. Chir. 1927 Nr. 22.
- Wolffohn: Bemerkungen zur Arbeit von Krabbel. Zbl. Chir. 1926 Nr. 30.
- Schlesinger: Zur Frage der Nachblutungen nach Gastroenterostomien. Zbl. Chir. 1926 Nr. 44.
- Jungbluth: Bemerkungen zu dem Beitrag von Krabbel. Zbl. Chir. 1926 Nr. 32. Zbl. Chir. 1927 Nr. 10.
- Nägeli: Blutuntersuchungen an Magenkranken unter Berücksichtigung der Frage der postoperativen Nachblutung. Zbl. Chir. 1933.
- Neufer: Blutuntersuchungen an Magenkranken unter Berücksichtigung der Frage der postoperativen Nachblutung. Dtsch. Bonn 1933.
- Finsterer: Über akute Magen- und Duodenalblutungen. Ztschr. Chir. 158.
- Schlosser: Nachblutungen am Magen nach Eingriffen am Magen. Med. Klinik 1924 Nr. 37.
- Krecke: Bericht über die Sitzung der Münchener Chirurgenvereinigung. 24. Januar 1928. Zbl. Chir. 1928 Nr. 12.
- v. Redwitz: Die chirurgische Behandlung des Magen-Darm-Geschwürs. Ärztl. Rdsch. 1929.
- Huek: Blutplättchen-Untersuchungen bei chirurgischen Erkrankungen. Dtsch. Ztschr. Chir. 192.
- Ssokoloff u. Gladysewsky: Die postoperativen Veränderungen der Zahl der Erythrocyten und Blutplättchen. Referat im Zentral-Organ f. d. gef. Chirurgie. 1925 XXX H. 3.

- König: Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des Kernzerfalls für die Entstehung der Thrombose. Archiv klin. Chir. 167.
- Fenkner: Wie sind Magenblutungen nach Operationen zu erklären. Archiv klin. Chir. 174.
- Puhl u. Broderfen: Zur Aethiologie der ulcerösen Gastritis und Duodenitis. Archiv klin. Chir. 168.
- Kokoris: Eine seltene Komplikation der sectio alta: postoperative Magen-Darm-Blutung. Zbl. Chir. 1930 Nr. 24.
- v. Haberer: Zur Vermeidung von Nachblutungen nach Magenoperationen. Zbl. Chir. 1933 S. 2568. Zbl. Chir. 1930 S. 71.
- Flörken: Zur Vermeidung von Nachblutungen nach Magenoperationen. Zbl. Chir. 1933 S. 2013.
- Rüdel: Übertragung von übergroßen Blutmengen bei lebensbedrohlichen Blutungen nach Operationen. Zbl. Chir. 1932 S. 2597.
- Popper: Transfusion von $2\frac{1}{2}$ Liter Blut bei einer Nachblutung nach Magenoperation. Zbl. Chir. 1931 S. 2817.
- Otte: Bluttransfusion von 2000 ccm innerhalb von 15 Stunden bei postoperativer lebensbedrohlicher Blutung nach Magenresektion. Zbl. Chir. 1932 S. 1379.
- Payr: Zur Verwendung der Jodtinkturdesinfektion am eröffneten Magen-Darm-Kanal. Zbl. Chir. 39 S. 386.
- Raufche: Die Behandlung postoperativer Magenblutungen mit Eigenblutinjektionen. Dtsch. Ztschr. Chir. 198 S. 108.
- Gurewitsch: Referat im Zbl. Chir. 1929 Nr. 1.
- Krämer: Über zwei neue Blutstillungsmittel. Zbl. Chir. 1926 S. 2926.
- Mertz: Zur Frage der Blutstillung durch Milzbestrahlung. Zbl. Chir. 1928 Nr. 43.
-

Lebenslauf.

Ich, Franz Riebschläger, wurde am 21. Juni 1908 in Prüm i. d. Eifel als Sohn des Landeskulturinspektors Albert Riebschläger und seiner Ehefrau Maria geb. Sehl geboren. Nach dem Besuch der Volksschule und der Gymnasialvorschule meiner Heimatstadt wurde mein Vater nach Gumbinnen i. Ostpr. veretzt, wo ich das humanistische Gymnasium bis Obertertia besuchte, von da ab absolvierte ich das weitere Gymnasialstudium wegen nochmaliger Veretzung meines Vaters nach Jülich am dortigen humanistischen Gymnasium, wo ich am 7. März 1928 die Reifeprüfung ablegte. Darauf studierte ich in Bonn und Wien Germanistik und Musikwissenschaft bis zum WS. 1929/30. Das danach begonnene Studium der Medizin erledigte ich ausschließlich an der Universität Bonn; die ärztliche Vorprüfung bestand ich im Oktober 1932, das Staatsexamen im WS. 1935/36.
